ROSA RUBRIFOLIA.

R. germinibus ovatis pedunculisque glabris glaucescentibus, petiolis aculeatis, caule aculeis sparsis uncinatis, foliolis oblongis argute serratis glabris (glauco-rubris), floribus subcorymbosis. Willipspec. 2, pag. 1075. Pers. syn. 32. Vill. Fl. du Dauph. 3, pag. 549.

R. (Multiflora.) Regnier, Act. Soc. Laus. 1, pag. 70.

R. (Canina.) fol. glaucis rubedine tinctis, floreque rubro. (Var. b.) Suter. Flor. Helvet. 1, pag. 302, nº 13.

Rosier à feuilles rougeâtres, DC. Nouv. Fl. franç. 3711.

R. (Glauca.) Deleuze, dans l'Hist. des arbres et arbrisseaux de Desfontaines, 2, pag. 165.

ROSIER A FEUILLES ROUGEATRES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, rougeâtre et recouvert d'une poussière glauque dans toutes ses parties, forme un buisson dont les tiges s'élèvent jusqu'à huit, et même dix pieds, plus ou moins, selon le site dans lequel il végète. Ses tiges sont armées d'aiguillons fermes et recourbés. Les feuilles, munies à leur base de deux stipules entières, se composent de cinq, sept, et quelquefois de neuf folioles ovales-oblongues, molles au toucher, dentées en scie, glabres, glauques, d'une teinte vineuse, particulièrement en-dessous : leur pétiole est muni d'aiguillons jaunâtres. Les fleurs rouges, dans leur jeunesse, et d'un blanc-verdâtre dans leur entier développement, sont disposées en bouquet au sommet des rameaux. Chaque pé-